

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DU NORD-OUEST - Arras - Tél. 23.14
(SEINE-MARITIME, SOMME, PAS-DE-CALAIS, NORD)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, - Station d'Alertes Agricoles d'ARRAS.
C. C. P. : LILLE 57-01-67

ABONNEMENT ANNUEL
15 NF

N° XLIII - 9 Avril 64

AVERTISSEMENTS

TAVELURES DES ARBRES FRUITIERS A PEPINS

CULTURES FRUITIÈRES

L'évolution de la végétation devient plus active. De plus, les contaminations par ascospores sont dès maintenant possibles à la faveur de prochaines pluies. La protection des vergers doit donc être assurée.

En conséquence,

Sur tous les poiriers et sur les pommiers arrivés à un stade réceptif (stade D - apparition des premières petites feuilles) il y a lieu d'effectuer un traitement soigné avant les prochaines pluies. En cette période de début de végétation il y a toujours intérêt à essayer de retarder l'opération le plus possible de façon à couvrir le maximum de surfaces végétatives.

Donc, à la réception de cet avis,

- si le temps est au beau stable, reculer l'opération de quelques jours.
- si le temps est incertain, intervenir immédiatement.

PUCERON VERT DU POMMIER : Cet insecte est présent et actif dans de nombreux vergers sur les jeunes bourgeons. Ajouter éventuellement à la bouillie un produit à base d'H C H ou de lindane ce qui permettra de lutter en même temps contre d'autres ravageurs préfloraux.

OIDIUM DU POMMIER : Dans les vergers sensibles, profiter de l'opération pour lutter contre cette maladie à l'aide d'un des produits conseillés.

INFORMATIONS

DESINFECTION DES SEMENCES

L I N

L'enrobage des semences avec un fongicide (organo-mercuriques, TMTD etc...) permet de lutter contre les fontes de semis. L'adjonction d'un insecticide (lindane, etc...) permet de limiter les attaques d'altises surtout dangereuses à la levée.

SEPTORIOSE DU CELERI

CULTURES MARAICHÈRES

La désinfection des semences est très conseillée soit par enrobage avec du TMTD à 1 % par exemple, soit par trempage pendant 30 minutes dans une solution de formol à 2 % suivi d'un lavage à l'eau claire et d'un séchage rapide.

Ensuite, dans les couches, des traitements répétés avec des fongicides organiques de synthèse permettront d'assurer des plants sains, condition première d'une bonne réussite en pleine terre.

MOUCHE GRISE

CEREALES

Des dégâts importants sont constatés en particulier dans la région de Lille, le Pévèle, le Calaisis.

La lutte curative ne paraît guère certaine actuellement. Préventivement, seul l'enrobage des semences avec un insecticide à forte dose permet de limiter ces dégâts (par exemple, produits contenant 40 % de lindane). Cette opération est à conseiller en cas de resemis.

R E C T I F I C A T I F

D L P 16-4-64 297891

Dans la liste des produits conseillés à la page 3, 1ère colonne, à la rubrique "Petite Altise du Colza", lire : DDT et DDD : 600 Grs de matière active à l'hectare (au lieu de 60 Grs)

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles,
R. DIVOUX

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux,
P. COUTURIER